Levure de Riz Rouge +

Complément alimentaire aux extraits naturels, la Levure de Riz Rouge agit efficacement pour rétablir un taux de lipides sanguin idéal

Efficace et rapide, la **Levure de Riz Rouge** est un complément alimentaire qui renferme des composés à action spécifique sur les lipides sanguins comme la monacoline K (Lovastatine), le policosanol issu de canne à sucre ou l'acide chlorogénique issu d'artichaut qui va agir directement au niveau du foie. De plus, il contient du coenzyme Q10 et de la vitamine E qui vont permettre de soutenir le système cardiovasculaire dans son ensemble.
Tous ces ingrédients agissent efficacement contre les taux de cholestérols et de triglycérides élevés sans les effets secondaires rencontrés avec les statines de synthèse : douleurs musculaires, troubles hépatiques...

Retrouver un équilibre lipidique idéal. Diminuer progressivement votre consommation de statines !

• LA LEVURE DE RIZ ROUGE :
Les populations asiatiques utilisent la LEVURE DE RIZ ROUGE depuis des siècles pour aider le cœur et les vaisseaux sanguins. La levure de riz rouge est composée de riz sur lequel on a fait fermenter une variété de levure rouge appelée Monascus purpureus.
La levure de riz rouge contient une statine naturelle, la lovastatine, dont l'efficacité a été indiscutablement démontrée par des études menées dans de nombreux pays. La consommation de levure de riz rouge permet donc de **diminuer significativement** le taux de **LDL cholestérol** sanguin (ou « mauvais » cholestérol) et le **taux de triglycérides** sans effets secondaires au niveau du foie et des muscles, tout en **augmentant le taux de HDL cholestérol**.
L'efficacité de la levure de riz rouge s'explique par le fait que le cholestérol est principalement fabriqué par le foie et ne provient pas uniquement de l'alimentation. Un foie fatigué et engorgé (même en faisant un régime strict sans graisse ni sucre) va fabriquer en excès de la graisse. C'est une enzyme (**HMG – CoA réductase**) située dans le foie qui produit le cholestérol endogène. En neutralisant cette enzyme, la levure de riz rouge réduit de ce fait la production de graisses dont le cholestérol. Ceci diminue également le taux de coenzyme Q_{10}. C'est pour cela que notre produit contient CoQ_{10} en plus de toutes ces propriétés intrinsèques.

De nombreuses études confirment l'efficacité de cette levure. Récemment, une **étude menée en 2008 (voir résumé ci-après)** a démontré que la levure de riz rouge permet une importante réduction du taux de LDL cholestérol diminuant de 42,4% le taux de cholestérol sanguin de patients atteints d'hypercholestérolémie, sans aucun effet indésirable (effet plus efficace qu'une statine de synthèse comme le Zocor® aussi appelé Simvastatin).

• L'ARTICHAUT :
Originaire du bassin méditerranéen, l'artichaut est un légume cultivé et consommé depuis l'antiquité. Son utilisation est réputée. En effet, l'artichaut agit sur le **foie** et la **vésicule biliaire** qu'il renforce vis-à-vis des infections en éliminant les toxines. De plus, depuis plus d'une dizaine d'année, on sait maintenant qu'un de ses principes actifs, appelé cynarine (dont le précurseur est l'acide chlorogénique) amène à **diminuer le taux de cholestérol total**. Ces molécules inhiberaient la synthèse du cholestérol endogène en prévenant donc la production de LDL-Cholestérol.

• LE POLICOSANOL :
Le policosanol est un composé réunissant plusieurs alcools aliphatiques ou « alcools gras » à longues chaines de carbone, dont le plus abondant est l'octosanol. Il est généralement extrait de canne à sucre ou de matière cireuse (comme la cire d'abeille). Il agit sur la synthèse endogène du cholestérol. Il possède une double **activité hypocholestérolémiante** et une **activité antiagrégante**. Ses effets ont maintenant été **démontrés *in vivo* et *in vitro***, sur des modèles animaux expérimentaux et sur l'homme sain et malade. Les travaux de recherche permettent de dire que ce composé est maintenant utilisable comme une aide à la prévention et aux traitements de certaines pathologies cardiovasculaires.
Il permet de **diminuer le taux de cholestérol sanguin**. Il inhibe la biosynthèse hépatique du cholestérol en modulant l'activité enzymatique l'HMG-CoA réductase, l'enzyme contrôlant la synthèse du cholestérol. A l'inverse des statines de synthèse, le policosanol comme la levure de riz rouge, n'induit **aucun effet secondaire**.

• LE COENZYME Q10 :
La levure de Riz Rouge, l'extrait d'Artichaut et le policosanol, voient leur action soutenue par le **coenzyme Q_{10}** molécule **essentielle à la vie**. Elle permet la production d'énergie (sous forme d'ATP) au niveau de tous les organes du corps humain. C'est aussi un antioxydant qui permet de **diminuer la pression artérielle** et participe à la protection du système cardiovasculaire contre les **principales pathologies** rencontrées en le soutenant dans son effort au quotidien. Le Coenzyme Q_{10} est aussi un puissant antioxydant, anti-cholestérolémiant, anti-athéromateux qui améliore la production d'énergie. Associé à la levure de riz rouge et aux autres éléments présents dans ce complexe, il **permet d'éviter la diminution du taux d'hormones stéroïdiennes**.

Levure de riz rouge + :
Réf. : PHSV065
30 comprimés
Septembre 2009

FICHE TECHNIQUE CONFIDENTIELLE À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. CET USAGE DOIT ÊTRE PERSONNEL AU DISTRIBUTEUR ET STRICTEMENT RÉSERVÉ À L'EXÉCUTION DE SON ACTIVITÉ ET DE LA PRÉSENTATION ET LA VENTE DES PRODUITS DE SANTÉ VERTE AUQUEL ILS SE RATTACHENT. TOUT AUTRE USAGE ET TOUTE REPRODUCTION SONT INTERDITS.

Levure de Riz Rouge +

• LA VITAMINE E
La vitamine E ou tocophérol posséde un fort pouvoir antioxydant. Une des ses propriétés est qu'elle permet de **diminuer l'oxydation** des lipoprotéines de faibles densité (**LDL**) qui transporte le cholestérol endogène du foie vers le reste du cœur ; réduisant ainsi le taux de cholestérol circulant et les pathologies cardiovasculaires qui en découlent.

Composition pour 1 comprimé :		% AJR
Levure de riz rouge (*Monascus purpureus*) standardisée à 0,4% de monacoline K	600 mg	
Artichaut (*Cynara scolymus*) standardisé à 5% d'acide chlorogénique	110 mg	
Coenzyme Q10	20 mg	
Canne à sucre (*Saccharum officinarum*) titrée à 60% de policosanol (apportant 10 mg d'actifs)	16,7 mg	
Vitamine E naturelle	5 mg	41,7 %

Ingrédients : Levure de riz rouge (*Monascus purpureus*), Antiagglomérants : phosphate di-calcique, phosphate tri-calcique, mono, di et triglycérides d'acides gras ; Extrait sec d'Artichaut (*Cynara scolymus*), Agent de charge : fructo-oligosaccharides; Agents d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, acide stéarique, phosphate dicalcique ; Coenzyme Q_{10}, Extrait de canne à sucre (*Saccharum officinarum*), Vitamine E naturelle (Alpha tocopherol acétate).

Conseils d'utilisation : Prendre 1 comprimé par jour.

Précautions d'emploi : Femmes enceintes et allaitantes, demander conseil à votre médecin. Tenir hors de portée des enfants.

Simvastatin versus therapeutic lifestyle changes and supplements: randomized primary prevention trial.

Becker DJ, Gordon RY, Morris PB, Yorko J, Gordon YJ, Li M, Iqbal N.

Division of Cardiology, Chestnut Hill Hospital, University of Pennsylvania Health System, Philadelphia, PA, USA. dbeckerchcardiology@hotmail.com

OBJECTIVE: To compare the lipid-lowering effects of an alternative regimen (lifestyle changes, red yeast rice, and fish oil) with a standard dose of a 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor (statin). **PATIENTS AND METHODS**: This randomized trial enrolled 74 patients with hypercholesterolemia who met Adult Treatment Panel III criteria for primary prevention using statin therapy. All participants were randomized to an alternative treatment group (AG) or to receive simvastatin (40 mg/d) in this open-label trial conducted between April 1, 2006, and June 30, 2006. The alternative treatment included therapeutic lifestyle changes, ingestion of red yeast rice, and fish oil supplements for 12 weeks. The simvastatin group received medication and traditional counseling. The primary outcome measure was the percentage change in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Secondary measures were changes in other lipoproteins and weight loss. **RESULTS**: There was a statistically significant reduction in LDL-C levels in both the AG (-42.4%+/-15%) (P<.001) and the simvastatin group (-39.6%+/-20%) (P<.001). No significant differences were noted between groups. The AG also demonstrated significant reductions in triglycerides (-29% vs -9.3%; 95% confidence interval, -61 to -11.7; P=.003) and weight (-5.5% vs -0.4%; 95% confidence interval, -5.5 to -3.4; P<.001) compared with the simvastatin group. **CONCLUSION**: Lifestyle changes combined with ingestion of red yeast rice and fish oil reduced LDL-C in proportions similar to standard therapy with simvastatin. Pending confirmation in larger trials, this multifactorial, alternative approach to lipid lowering has promise for a subset of patients unwilling or unable to take statins.

Levure de riz rouge + :
Réf. : PHSV065
30 comprimés
Septembre 2009

FICHE TECHNIQUE CONFIDENTIELLE À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. CET USAGE DOIT ÊTRE PERSONNEL AU DISTRIBUTEUR ET STRICTEMENT RÉSERVÉ À L'EXÉCUTION DE SON ACTIVITÉ ET DE LA PRÉSENTATION ET LA VENTE DES PRODUITS DE SANTÉ VERTE AUQUEL ILS SE RATTACHENT. TOUT AUTRE USAGE ET TOUTE REPRODUCTION SONT INTERDITS.