

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
 - La persistance des symptômes au-delà de 10 jours, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination
HERPÈVIR 5 %[®], crème
Composition (Pour 100 g de crème)
• La substance active est : Aciclovir
• Les autres composants sont : Alcool cétylostéarylique, paraffine liquide, vaseline, propylène glycol, eau purifiée, poloxamère 407, laurilsulfate de sodium.

Nom et adresse de l'exploitant
LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE - 2-4 RUE CHAINTRON - 92120 MONTROUGE
Nom et adresse du fabricant
LABORATOIRES CHEMINEAU - 93 ROUTE DE MONNAIE - 37210 VOUVRAY

QU'EST-CE QUE HERPÈVIR 5 %[®], crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique
Ce médicament est un antiviral.

Forme pharmaceutique
Ce médicament se présente sous forme de crème. Pompe doseuse de 2 g.

Indications thérapeutiques
Ce médicament est indiqué dans le traitement des poussées d'herpès labial localisé appelé aussi « boutons de fièvre » chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER HERPÈVIR 5 %[®], crème ?

Ne pas utiliser HERPÈVIR 5 %[®], crème dans les cas suivants :

- Chez l'enfant de moins de 6 ans.
- Allergie connue à l'aciclovir ou à l'un des autres composants de la crème (voir composition).
- En application dans l'œil, dans la bouche, dans le vagin.

Mises en garde spéciales

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Précautions d'emploi

Prenez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin en cas de doute sur la nature de votre lésion. En cas d'absence de cicatrisation au bout de 10 jours de traitement ou d'aggravation, arrêtez le traitement et prenez un avis médical.

En cas de poussée d'herpès labial, quelques précautions d'hygiène s'imposent, pour protéger votre entourage du **risque de transmission du virus** :

- Évitez le contact rapproché, un baiser par exemple, avec votre entourage.
- N'EMBRASSEZ JAMAIS UN ENFANT EN BAS ÂGE
- Lavez-vous soigneusement les mains en cas de contact avec la lésion.
- Au cours du traitement, afin de ne pas propager les lésions, ne frottez ni vos yeux ni vos paupières avec vos mains et si vous portez des lentilles de contact, ne les humidifiez jamais avec votre salive.
- Évitez de toucher ou de gratter les lésions.

En cas d'une autre localisation de la crise d'herpès, n'utilisez jamais cette crème, PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

Grossesse / Allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, n'utilisez pas cette crème sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Liste des excipients à effet notoire

Propylène glycol

Prise en utilisation d'autres médicaments

Il est déconseillé d'utiliser HERPÈVIR 5 %[®], crème, avec d'autres crèmes. Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

COMMENT UTILISER HERPÈVIR 5 %[®], crème ?

N'utilisez pas cette crème chez l'enfant de moins de 6 ans.

Posologie

Appliquez la crème sur les lésions et autour des lésions, 5 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Réservé à l'USAGE EXTERNE.

- Débutez les applications dès les premières démangeaisons ou brûlures avant même que n'apparaissent les vésicules, le traitement étant plus efficace s'il est commencé dès les premiers symptômes annonçant une poussée d'herpès labial (bouton de fièvre).
- Lavez-vous les mains soigneusement avant et après application de la crème sur votre bouton de fièvre afin d'éviter de transmettre l'infection.
- Appliquez la crème avec le doigt, en débordant largement autour de la lésion.

Fréquence d'administration

Les applications sont à répartir dans la journée avec un intervalle d'au moins 3 à 4 heures entre 2 applications.

Par exemple :

- Le matin après le petit déjeuner,
- A midi après le déjeuner,
- Vers 16-17 h,
- Le soir après le dîner,
- Le soir avant le coucher.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 10 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

- Si vous avez utilisé plus de HERPÈVIR 5 %[®], crème que vous n'auriez dû : consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Si vous oubliez d'utiliser HERPÈVIR 5 %[®], crème : n'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HERPÈVIR 5 %[®], crème est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- Des sensations de picotements ou de brûlures transitoires peuvent suivre l'application de la crème,
- Un érythème (rougeur) ou une sécheresse de la peau,
- Risque d'eczéma (réaction allergique de la peau), notamment en raison de la présence de propylène glycol.

Dans ce cas, arrêtez le traitement et demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER HERPÈVIR 5 %[®], crème ?

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la pompe doseuse.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : décembre 2006.

CONSEILS/ÉDUCATION SANITAIRE

Les boutons de fièvre ou herpès labial sont dus à une infection provoquée par un virus appelé *Herpes simplex*. Après une primo-infection, le virus persiste dans l'organisme sans entraîner de symptômes.

A l'occasion d'un événement comme la fatigue, les règles, la fièvre, une émotion ou une exposition solaire, le virus peut parfois être réactivé et provoquer l'apparition de vésicules (cloques) en bouquet autour des lèvres, appelées boutons de fièvre. Ces vésicules sont contagieuses jusqu'à l'apparition des croûtes, signe de cicatrisation.

Il existe des signes avant-coureurs localisés au lieu habituel de la lésion, qui se traduisent généralement par une sensation de brûlure et/ou de picotements.

Ces signes sont importants à connaître :

- c'est dès l'apparition qu'il faut débiter le traitement qui empêche la multiplication virale et permet de prévenir ou de limiter l'évolution du bouton de fièvre,
 - c'est aussi dès leur apparition qu'il faut respecter les règles d'hygiène qui vous sont données dans les précautions d'emploi, afin de diminuer le risque de transmission du virus.
- En revanche, l'aciclovir ne peut agir sur les virus qui persistent à l'état latent dans l'organisme et l'aciclovir n'empêche pas la survenue de récurrences après l'interruption du traitement.