


Splénocarbine

17 p.cent



Laboratoires GABRIEL LESOURD

Bolcitol

Phytothérapie hépatobiliaire



Laboratoires GABRIEL LESOURD

Splénocarbine

17 p.cent

FORME ET PRÉSENTATION

Granulé à croquer. Boîte de 100 g.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Charbon activé 17 g
Excipients : huile essentielle d'anis, saccharose q.s.p. 100 g

DONNÉES CLINIQUES

Indications thérapeutiques

Traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles intestinales, notamment avec météorisme.

Posologie et mode d'administration

Réservé à l'adulte

1 à 3 cuillères à café, après les repas.

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Mises en garde et précautions particulières d'emploi

■ En cas de diarrhée associée, la nécessité d'une réhydratation devra être évaluée. L'importance de la réhydratation par soluté de réhydratation orale ou par voie intraveineuse doit être adaptée en fonction de l'intensité de la diarrhée, de l'âge et des particularités du patient (maladies associées...)

■ En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte de la teneur en saccharose : 4,15 g par cuillère à café.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Du fait des propriétés du charbon, la diminution potentielle de l'absorption des médicaments conduit à administrer toute autre médication à distance (plus de 2 heures, si possible) de la prise de ce médicament.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il n'y a pas d'étude de tératogénèse disponible chez l'animal. En clinique, l'utilisation du charbon sur des effectifs limités n'a apparemment révélé aucun effet malformatif ou foetotoxique à ce jour. Toutefois, des études épidémiologiques sont nécessaires pour confirmer l'absence de risque. En conséquence, mais compte tenu de l'absence de résorption du charbon, l'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Allaitement

La prise de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Effets indésirables

L'utilisation de ce médicament à des doses élevées peut provoquer une coloration plus foncée des selles.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Propriétés pharmacodynamiques

ADSORBANT INTESTINAL. (A : appareil digestif et métabolisme).

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

AMM 309 915 7 : 100 g en sachet (kraft-aluminium PE)

Non remboursé par la Sécurité sociale.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS - Tél. 01 46 06 41 08

DATE DE RÉVISION : 22.02.1999

Bolcitol

Phytothérapie hépatobiliaire

FORME ET PRÉSENTATION

Solution buvable Flacon (verre brun) de 125 ml.

COMPOSITION

p. 100 ml

Extrait fluide de Fumeterre 5,4 g

Extrait fluide de Boldo 3,6 g

Extrait fluide de Sauge 3,6 g

Teinture de Fenouil 3,6 g

Excipients : saccharose (6 g/100 ml), glycérol, alcool (10 g/100 ml), eau purifiée.

Titre alcoolique 14 % (v/v).

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Phytothérapie à visée hépatobiliaire.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination rénales et digestives.

Traditionnellement utilisé comme cholérétique ou cholagogue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une cuillère à café de solution contient 0,56 g d'alcool pur.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte.

1 à 3 cuillères à café par jour dans un verre d'eau, le matin à jeun ou avant les repas.

AMM 301 338.0 : 125 ml en flacon (verre brun)

Non remboursé par la Sécurité sociale.

• *La fumeterre est amphocholérétique, régulateur du flux biliaire*

• *La fumeterre et la sauge ont une action antispasmodique sur le sphincter vésical et sur les fibres lisses des voies biliaires.*

• *Le boldo est stimulant de la digestion par effets cholagogue et cholérétique.*

• *Le fenouil est un stimulant de la digestion et un antispasmodique particulièrement au niveau intestinal.*

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS - Tél. 01 46 06 41 08

Phytémag



Laboratoires GABRIEL LESOURD

Antinerveux lesourd

Lotier et Méllilot



Laboratoires Gabriel LESOURD

Glycérophosphate de magnésium	90 mg
Arche (poudre de racine)	40 mg
Bachu (poudre de feuille)	40 mg
Gingembre (poudre de rhizome)	40 mg
Prêle (poudre de parties aériennes stériles)	40 mg
Chlorophylle (E140)	10 mg
pour une gélule n°1 de 260 mg	
Enveloppe de la gélule : gélatine	

Gélule

Indications thérapeutiques

Traitement d'appoint de l'asthénie fonctionnelle.

Réserve à l'adulte.

1 à 3 gélules par jour, à répartir dans la journée.

Durée de traitement limitée à 4 semaines.

Ce médicament est contre-indiqué en cas de : Hypersensibilité à l'un des constituants de la gélule.

Il n'y a pas de données fiables de tératogénèse chez l'animal. En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi des grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout risque. En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

En raison de l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, son utilisation est à éviter pendant l'allaitement.

Propriétés pharmacodynamiques

A VISEE ANTI-ASTHÉNIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme).

Durée de conservation : 3 ans.

A conserver à l'abri de la lumière.

Plaquette thermoformée (Polychlorure de vinyle/Aluminium) de 10 gélules.

333 632.1 : 20 gélules sous plaquettes thermoformées (Polychlorure de vinyle/Aluminium).

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure - 75018 PARIS - Tél : 01 46 06 41 08

DATE DE REVISION : Février 1997



Antinerveux lesourd

Solution buvable en gouttes

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Lolier corniculé, parties aériennes fleuries, sous forme de macérat 5,5 g
Mélilot, sous forme de macérat 2,5 g
Ethanol à 50 % V/V q.s.p. 100 ml de solution buvable.

1 ml (40 gouttes) contient 0,47 g d'alcool éthylique.

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en gouttes

DONNÉES CLINIQUES

Indications thérapeutiques

Médicament de phytothérapie.

Traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des troubles neurotoniques, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil.

Posologie et mode d'administration

Voie orale. Réserve à l'adulte.

20 à 50 gouttes, 1 à 2 fois par jour. Diluer dans un peu d'eau ou dans une tisane.

DONNÉES PHARMACEUTIQUES

Durée de conservation : 3 ans.

Nature et contenance du récipient

Flacon en verre jaune de 45 ml, muni d'un compte gouttes en polyéthylène et fermé par une capsule en polypropylène blanc.

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

AMM 306 127.8 : 45 ml en flacon compte gouttes (verre/PE/PP)
(1944, validée en 1996).

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure - 75018 PARIS - Tél : 01 46 06 41 08

DATE DE REVISION : Mars 1996



Gastrotisane

FORME PHARMACEUTIQUE

Mélange de plantes pour tisane en sachet-dose

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aspérule odorante	0,50 g
Boldo	0,30 g
Menthe poivrée (feuille)	0,30 g
Fenouil doux (fruit)	0,20 g
Pissenlit (racine)	0,20 g
Oranger doux (zeste)	0,30 g
Romarin	0,20 g
pour un sachet-dose de	2 g

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Médicament de phytothérapie.

Traditionnellement utilisé comme cholérétique ou cholagogue.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte.

2 à 4 tasses par jour, en infusion, de préférence à la fin des repas.

Utiliser 1 sachet-dose par tasse d'eau bouillante.

DURÉE DE CONSERVATION

3 ans.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NATURE ET CONTENANCE DU RÉCIPIENT

Sachet-dose en papier non thermocoliant de 2 g de mélange de plantes pour tisane.

MODE D'EMPLOI, INSTRUCTIONS CONCERNANT

LA MANIPULATION

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet, couvrir, attendre pendant 10 à 15 minutes puis retirer le sachet.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

340 484-4 : étui de 20 sachets-dose (papier).

Non remboursé par la Sécurité Sociale

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS

MEDICAMENTS DE PHYTOTHERAPIE

Mélanges de plantes
pour tisane
en sachet dose

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS

Tél. : 01 46 06 41 08

Fax : 01 46 06 81 21

Anthylline

FORME PHARMACEUTIQUE

Mélange de plantes pour tisane en sachet-dose

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Hamamelis (feuille)	0,44 g
Mélicot	0,44 g
Vigne rouge	0,44 g
Lamier blanc (sommité fleurie)	0,40 g
Oranger doux (zeste)	0,28 g
pour un sachet-dose de	2 g

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Médicament de phytothérapie.

Traditionnellement utilisé

- dans les manifestations subjectives de l'insuffisance veineuse telles que jambes lourdes ;
- dans la symptomatologie hémorroïdaire.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte.

2 à 4 tasses par jour, en infusion, de préférence en dehors des repas.

Utiliser 1 sachet-dose par tasse d'eau bouillante.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI

Crise hémorroïdaire : l'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales. Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu.

DURÉE DE CONSERVATION

3 ans.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NATURE ET CONTENANCE DU RÉCIPIENT

Sachet-dose en papier non thermocollant de 2 g de mélange de plantes pour tisane.

MODE D'EMPLOI, INSTRUCTIONS CONCERNANT

LA MANIPULATION

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet, couvrir, attendre pendant 10 à 15 minutes puis retirer le sachet.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

340 481-5 : étui de 20 sachets-dose (papier)

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS

Arthritisane

FORME PHARMACEUTIQUE

Mélange de plantes pour tisane en sachet-dose.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Reine des prés (sommité fleurie)	0,50 g
Saule (écorce de tige)	0,50 g
Frêne (feuille)	0,40 g
Cassis (feuille)	0,40 g
Oranger amer (feuille)	0,20 g
pour un sachet-dose de	2 g

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Médicament de phytothérapie.

Traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des manifestations articulaires douloureuses mineures.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte.

2 à 4 tasses par jour, en infusion, de préférence en dehors des repas.

Utiliser 1 sachet-dose par tasse d'eau bouillante.

DURÉE DE CONSERVATION

3 ans.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NATURE ET CONTENANCE DU RÉCIPIENT

Sachet-dose en papier non thermocollant de 2 g de mélange de plantes pour tisane.

MODE D'EMPLOI, INSTRUCTIONS CONCERNANT

LA MANIPULATION

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet, couvrir, attendre pendant 10 à 15 minutes puis retirer le sachet.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

340 482-1 : étui de 20 sachets-dose (papier).

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS

Colitisane

FORME PHARMACEUTIQUE

Mélange de plantes pour tisane en sachet-dose.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Bec de grue (parties aériennes fleuries)	0,240 g
Guimauve (feuille)	0,216 g
Achillea millefeuille (sommité fleurie)	0,216 g
Pensée sauvage	0,144 g
Souci (capitule)	0,180 g
Oranger doux (zeste)	0,120 g
Romarin	0,084 g
pour un sachet-dose de	1,2 g

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Médicament de phytothérapie.

Traditionnellement utilisé comme traitement adjuvant de la composante douloureuse des troubles fonctionnels digestifs.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte.

2 à 5 tasses par jour, en infusion.

Utiliser 1 sachet-dose par tasse d'eau bouillante.

DURÉE DE CONSERVATION

3 ans.

PRÉCAUTION PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NATURE ET CONTENANCE DU RÉCIPIENT

Sachet-dose en papier non thermocollant de 1,2 g de mélange de plantes pour tisane.

MODE D'EMPLOI, INSTRUCTIONS CONCERNANT

LA MANIPULATION

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet, couvrir, attendre pendant 10 à 15 minutes puis retirer le sachet.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

340-483-8 : étui de 20 sachets-dose (papier).

Non remboursé par la Sécurité Sociale.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Laboratoires GABRIEL LESOURD

6, rue Sainte-Isaure 75018 PARIS